

NO SE CONTAGIA POR



Besos.



Abrazos.



Mosquitos.



Con sólo tocar o preparar los alimentos.



Compartiendo el mismo lugar de oficina, casa, o lugar público.

FORMAS DE PREVENIR EL VIH


EVITAR EL CONTAGIO POR VÍA SEXUAL ES NECESARIO

EVITAR EL CONTAGIO POR VÍA SANGÜÍNEA

EVITAR EL CONTAGIO POR PARTE DE LA MADRE AL BEBÉ



RECOMENDACIONES




¿QUÉ ES EL SIDA?

Es un complejo patológico que se caracteriza por la destrucción de la inmunidad natural del cuerpo, contra la enfermedad.

El sida es una enfermedad producida por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y hasta ahora no tiene cura.



¿CÓMO ACTÚA EL VIH?



El virus del SIDA ingresa al organismo a través de la sangre, el semen y los fluidos vaginales y una vez incorporado ataca el sistema inmunológico.

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE TENER VIH Y TENER SIDA



El SIDA es la etapa avanzada de la infección causada por el VIH.



Una persona tiene SIDA cuando el VIH ha debilitado las defensas del cuerpo (Sistema Inmunológico).

Cómo actúa el VIH

Transmisión del virus

Ocurre cuando ingresan al cuerpo sangre o fluidos sexuales infectados. Hay tres vías de infección comprobadas:



De madre a hijo

Puede haber transmisión perinatal durante el embarazo, el parto y la lactancia. Si la madre recibe tratamiento el riesgo de contagio se reduce al 2%.



Por contacto con sangre infectada

Al compartir agujas si se consumen drogas. Por un pinchazo o corte accidental con un elemento infectado.



Relaciones sexuales sin preservativo

A través del líquido preseminal, el semen y las secreciones vaginales.


RIESGO DE CONTAGIO, DE MAYOR A MENOR

- Relaciones anales
- Relaciones vaginales
- Relaciones orales

Síntomas de infección

Una persona que vive con VIH puede no presentar síntomas. En algunos casos aparecen varias semanas después de infectarse.

DURACION DE LOS SINTOMAS
Entre 3 y 14 días



COMPLICACIONES DEL SIDA



Una vez el VIH se convierte en Sida el riesgo de muerte es mucho mayor. Sin tratamiento una persona con sida puede morir por una simple infección. Virus, bacterias, hongos, parásitos pueden causar infección y cáncer.

Las infecciones pueden ser respiratorias, de la piel, candidiasis, diarreas, cerebrales como meningitis, encefalitis, cáncer.

"PUERTAS ABIERTAS"

